

KTMCC00018.01

Patiëntenkaart voor

Topamax

topiramaat



- Als u epilepsie heeft, mag u niet stoppen met het gebruik van topiramaat tenzij uw arts zegt dat u dit moet doen, omdat uw aandoening anders erger kan worden.

Bewaar deze kaart.

Voor vrouwen en meisjes die zwanger kunnen worden

Geboortebeperking en voorkoming van zwangerschap

Vraag aan uw arts om een patiëntengids of scan deze QR-code.



Wat moet u weten?

- Topamax is een geneesmiddel voor epilepsie en migraine.
- Topamax kan de gezondheid van een ongeboren kind ernstig schaden als het gebruikt wordt tijdens de zwangerschap.

<https://www.medcor.nl/wpcontent/uploads/aRMM-Topamax-RMMC00048.pdf>

Wat moet u doen?

- Lees vóór gebruik de bijsluiter en de patiëntengids zorgvuldig door.
- Gebruik tijdens uw behandeling met topiramaat en tot minstens 4 weken na uw laatste dosis topiramaat zeer effectieve voorbehoedsmiddelen. Uw arts zal u advies geven over de methode die voor u het meest geschikt is.

Patiëntenkaart voor

Topamax

topiramaat

- Ga minstens eenmaal per jaar naar uw arts om uw behandeling opnieuw te beoordelen.
- Als u denkt dat u zwanger bent geworden, praat dan direct met uw arts.
- Als u zwanger wilt worden, stop dan niet met het gebruik van voorbehoedsmiddelen tot u met uw arts hebt gepraat.