

Natriumcromoglicaat Medcor,
granulaat in sachets 200 mg
natriumcromoglicaat

BSMC00456.01/november 2023



Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Natriumcromoglicaat Medcor en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Natriumcromoglicaat Medcor en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het eten van bepaalde voedingsmiddelen kan een allergische reactie veroorzaken. Bij deze allergische reactie komen stoffen uit mestcellen vrij, die een ontstekingsreactie in uw maag of darmen kunnen veroorzaken. Het vrijkomen van deze stoffen kan leiden tot verschijnselen als misselijkheid, buikpijn, diarree, benauwdheid, allergische aandoeningen van de neus, huiduitslag, galbulten of eczeem. Natriumcromoglicaat Medcor is een middel dat het vrijkomen van deze stoffen remt.

Natriumcromoglicaat Medcor wordt door uw arts voorgeschreven om allergische verschijnselen te voorkomen, die veroorzaakt worden door bestanddelen in de voeding die niet altijd vermeden kunnen worden.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor natriumcromoglicaat of voor de hulpstoffen van Natriumcromoglicaat Medcor.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Eén Natriumcromoglicaat granulaat sachet 200 mg bevat 1760 mg suiker. Zie voor meer informatie het kopje 'Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Natriumcromoglicaat Medcor granulaat'. Gebruik Natriumcromoglicaat Medcor niet bij kinderen onder de 2 jaar. Het is niet bekend of Natriumcromoglicaat Medcor schadelijk is bij kinderen onder 2 jaar. Gebruik Natriumcromoglicaat Medcor niet als u een medische voorgeschiedenis heeft van een plotselinge ernstige allergische reactie (anafylactische shock) of andere levensbedreigende reacties op voedsel.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Natriumcromoglicaat Medcor nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem Natriumcromoglicaat Medcor **15 minuten vóór de maaltijd** in (zie rubriek 3 'Hoe gebruikt u dit middel?').

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Een effect is onwaarschijnlijk.

Natriumcromoglicaat Medcor granulaat bevat suiker.

Eén Natriumcromoglicaat Medcor granulaat sachet 200 mg bevat 1760 mg suiker. Als u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Als u suikerziekte (diabetes) heeft, kunt u beter geen Natriumcromoglicaat Medcor granulaat gebruiken, omdat dit middel suiker bevat. U kunt wel Natriumcromoglicaat drank gebruiken, deze bevat geen suiker.

Natriumcromoglicaat Medcor granulaat bevat natrium

Natriumcromoglicaat Medcor granulaat bevat minder dan 1 mmol natrium (23mg) per sachet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

Neem Natriumcromoglicaat Medcor **15 minuten voor de maaltijd** in. Als u Natriumcromoglicaat Medcor 4 x per dag moet gebruiken, betekent dit dat u (bij 3 maaltijden per dag) 3 x Natriumcromoglicaat Medcor vóór de maaltijd en 1 x vóór het slapen gaan moet gebruiken.

De gebruikelijke dosering is als volgt:

Granulaat in sachets volwassenen:

Neem 4 keer per dag 1 sachet met 200 mg vóór de maaltijd. Los de inhoud van het sachet op in een halve beker water en drink dit op.

gebruik bij kinderen:

Neem 4 keer per dag 1 sachet met 100 mg vóór de maaltijd. Los de inhoud van het sachet op in een halve beker water en drink dit op.

"De aanbevolen doseringen zijn niet allemaal mogelijk met dit product, echter er zijn producten met een lagere sterkte dan 200 mg beschikbaar."

Als de behandeling binnen 2-3 weken niet voldoende resultaat geeft, kan uw arts de dosering verhogen. Als de behandeling wel voldoende resultaat geeft, zal uw arts proberen de dosering weer te verlagen. De optimale dosering zal voor ieder persoon individueel worden bepaald.

Voedingsstoffen, waar u allergisch voor bent, kunnen soms al in de mond een allergische reactie veroorzaken. Als dit bij u ook het geval is, kunt u het beste uw mond spoelen met de oplossing, voordat u deze doorslikt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Over het algemeen zijn er geen nadelige effecten te verwachten, wanneer teveel Natriumcromoglicaat Medcor is gebruikt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruiken van Natriumcromoglicaat Medcor

Als u stopt met het gebruiken van Natriumcromoglicaat Medcor, kunnen de verschijnselen weer terugkeren, waarvoor u Natriumcromoglicaat Medcor kreeg voorgeschreven. Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In enkele gevallen is melding gemaakt van misselijkheid, braken, buikklachten, huiduitslag en gewrichtspijnen. Zeer zelden is er een allergische reactie gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl

5. Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na 'EXP' en op het sachet na 'Verwendbar bis'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Natriumcromoglicaat granulaat:

- De werkzame stof in dit middel is natriumcromoglicaat; en wel 200 mg per sachet.
- De andere stof is suiker (zie het kopje 'Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Natriumcromoglicaat granulaat' voor meer informatie):

Hoe ziet Natriumcromoglicaat Medcor eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Natriumcromoglicaat Medcor granulaat is verpakt in doosjes van 50 sachets.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder/ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE Lelystad

Fabrikant granulaat

Pädia GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
Duitsland

In het register ingeschreven onder:

Natriumcromoglicaat Medcor, granulaat in sachets 200 mg
RVG 127196//10228 L.v.h: Duitsland

Dit product is in Duitsland op de markt onder de volgende naam:
Pentatop 200 mg Granulat.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2024