

**Gerenvooidere versie**

**APREMILAST TEVA 10 MG + 20 MG + 30 MG FILMOMHULDE TABLETTEN  
APREMILAST TEVA 30 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN  
filmomhulde tabletten**

**MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 9 juli 2024**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Bladzijde : 1**

**BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER**

**Apremilast Teva 10 mg, filmomhulde tabletten**

**Apremilast Teva 20 mg, filmomhulde tabletten**

**Apremilast Teva 30 mg, filmomhulde tabletten**

apremilast

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Apremilast Teva en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit medicijn in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. WAT IS APREMILAST TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MEDICIJN INGENOMEN?**

Dit medicijn bevat de werkzame stof 'apremilast'. Deze stof behoort tot een groep medicijnen die fosfodi-esterase-4-remmers worden genoemd en die ontsteking verminderen.

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met de volgende aandoeningen:

- **actieve arthritis psoriatica** - als u een ander soort medicijn, de DMARD's (*Disease-Modifying Antirheumatic Drugs*), niet kunt gebruiken of als u één van deze medicijnen heeft geprobeerd en het niet werkte
- **matige tot ernstige chronische plaque-psoriasis** - als u een van de volgende behandelingen niet kunt gebruiken of als u één van deze behandelingen heeft geprobeerd en het niet werkte:
  - fotherapie - een behandeling waarbij bepaalde gebieden van de huid aan ultraviolet licht worden blootgesteld
  - systemische behandeling - een behandeling die invloed heeft op het hele lichaam en niet op slechts één lokale plaats, zoals cyclosporine, methotrexaat of psoraleen.

### **Gerenvoieerde versie**

## **APREMILAST TEVA 10 MG + 20 MG + 30 MG FILMOMHULDE TABLETTEN APREMILAST TEVA 30 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN filmomhulde tabletten**

### **MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Datum : 9 juli 2024**

**Bladzijde : 2**

- **ziekte van Behçet (BD)** - om de mondzweren te behandelen die een veel voorkomend probleem zijn bij mensen met deze ziekte.

### **Wat is arthritis psoriatica?**

Arthritis psoriatica is een ontstekingsziekte van de gewrichten die gewoonlijk gepaard gaat met psoriasis, een ontstekingsziekte van de huid.

### **Wat is plaque-psoriasis?**

Psoriasis is een ontstekingsziekte van de huid die rode, schilferige, dikke, jeukende, pijnlijke vlekken op uw huid kan veroorzaken en die ook uw hoofdhuid en nagels kan aantasten.

### **Wat is de ziekte van Behçet?**

De ziekte van Behçet is een zeldzame vorm van een ontstekingsziekte die veel delen van het lichaam aantast. Het meest voorkomende probleem zijn mondzweren.

### **Hoe werkt dit medicijn?**

Arthritis psoriatica, psoriasis en de ziekte van Behçet zijn aandoeningen die gewoonlijk levenslang duren en waarvoor momenteel geen genezing bestaat. Dit medicijn vermindert de activiteit van een enzym in het lichaam genaamd fosfodi-esterase-4, dat betrokken is bij het ontstekingsproces. Doordat dit medicijn de activiteit van dit enzym vermindert, kan dit medicijn helpen de ontsteking die gepaard gaat met psoriatische artritis, psoriasis en de ziekte van Behçet onder controle te houden en hierdoor de klachten en symptomen van deze aandoeningen verminderen.

Bij arthritis psoriatica leidt de behandeling met dit medicijn tot een verbetering van de gezwollen en pijnlijke gewrichten en kan het uw algemeen lichamenlijk functioneren verbeteren.

Bij psoriasis leidt de behandeling met dit medicijn tot een afname van de psoriatische plaques op de huid en andere klachten en symptomen van de ziekte.

Bij de ziekte van Behçet vermindert de behandeling met dit medicijn het aantal mondzweren en kan ze volledig stoppen. Het kan ook de pijn verminderen die ermee gepaard gaat.

Van dit medicijn is ook aangetoond dat het de kwaliteit van leven verbetert bij patiënten met psoriasis, arthritis psoriatica of de ziekte van Behçet. Dit betekent dat de impact van uw aandoening op dagelijkse activiteiten, relaties en andere factoren kleiner zou moeten zijn dan voorheen.

## **2. WANNEER MAG U DIT MEDICIJN NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

### **Wanneer mag u dit medicijn niet innemen?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

### **Gerenvooiderde versie**

<b>APREMILAST TEVA 10 MG + 20 MG + 30 MG FILMOMHULDE TABLETTEN</b> <b>APREMILAST TEVA 30 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN</b> <b>filmomhulde tabletten</b>
---

**MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Datum : 9 juli 2024**

**Bladzijde : 3**

- U bent zwanger of denkt dat u zwanger bent.

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt.

#### **Depressie en zelfmoordgedachten**

Vertel het uw arts voordat u begint met dit medicijn als u een depressie heeft die erger wordt met gedachten aan zelfmoord.

U of uw verzorger moet ook onmiddellijk uw arts op de hoogte brengen van alle veranderingen in gedrag of stemming, gevoelens van depressie en van eventuele zelfmoordgedachten na het innemen van dit medicijn.

#### **Ernstige nierproblemen**

Als u ernstige nierproblemen heeft, zal uw dosis anders zijn - zie rubriek 3.

#### **Als u ondergewicht heeft**

Neem contact op met uw arts wanneer u onbedoeld gewicht verliest terwijl u dit medicijn gebruikt.

#### **Darmproblemen**

Als u last heeft van ernstige diarree, misselijkheid of braken, vertel dit dan aan uw arts.

#### **Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Dit medicijn is niet onderzocht bij kinderen en jongeren tot 18 jaar en daarom wordt het niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren van 17 jaar en jonger.

#### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Apremilast Teva nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor medicijnen die u zonder voorschrift kunt krijgen en kruidenmedicijnen. Dit is omdat Apremilast Teva invloed kan hebben op de wijze waarop bepaalde andere medicijnen werken. Sommige andere medicijnen kunnen ook invloed hebben op de wijze waarop Apremilast Teva werkt.

Neem zeker contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt, als u één van de volgende medicijnen inneemt:

- rifampicine - een antibioticum dat gebruikt wordt voor tuberculose
- fenytoïne, fenobarbital en carbamazepine - medicijnen die gebruikt worden voor de behandeling van aanvallen of epilepsie
- sint-janskruid - een kruidenmedicijn voor lichte angst en depressie.

#### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

## Gerenvooidere versie

### APREMILAST TEVA 10 MG + 20 MG + 30 MG FILMOMHULDE TABLETTEN APREMILAST TEVA 30 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN filmomhulde tabletten

#### MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 9 juli 2024

Bladzijde : 4

Er is weinig informatie over de effecten van dit medicijn tijdens de zwangerschap. U mag niet zwanger worden terwijl u dit medicijn inneemt en u moet tijdens de behandeling met dit medicijn een effectief voorbehoedsmiddel gebruiken.

Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk overgaat. U mag dit medicijn niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

#### Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit medicijn heeft geen effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken

#### Apremilast Teva bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn inneemt.

#### Apremilast Teva bevat natrium

Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

### 3. HOE NEEMT U DIT MEDICIJN IN?

Neem dit medicijn altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### Hoeveel neemt u in?

- Wanneer u voor het eerst met de inname van dit medicijn start, krijgt u een startverpakking met alle doses zoals beschreven in de tabel hieronder.
- De startverpakking is voorzien van een duidelijk etiket om ervoor te zorgen dat u de juiste tablet op het juiste tijdstip inneemt.
- Uw behandeling start met een lagere dosis die geleidelijk wordt verhoogd gedurende de eerste 6 dagen van de behandeling.
- De startverpakking bevat ook voldoende tabletten voor de volgende 8 dagen met de geadviseerde dosering (dag 7 tot 14).
- De geadviseerde dosering van dit medicijn is tweemaal daags 30 mg nadat de startfase is voltooid; één dosis van 30 mg in de ochtend en één dosis van 30 mg in de avond, met een tussentijd van ongeveer 12 uur, met of zonder voedsel.
- Dit geeft een totale dagdosering van 60 mg. Tegen het einde van dag 6 zult u deze geadviseerde dosering bereikt hebben.
- Wanneer u de geadviseerde dosering heeft bereikt, zult u enkel tabletten met een sterkte van 30 mg in uw voorgeschreven verpakkingen krijgen. U hoeft dit stadium van geleidelijke dosisverhoging slechts één keer door te maken, ook wanneer u de behandeling later zou herstarten.

Dag	Ochtenddosering	Avonddosering	Totale dagdosering
Dag 1	10 mg (lichtroze)	<b>Neem geen dosis</b>	10 mg

## Gerenvooidere versie

### APREMILAST TEVA 10 MG + 20 MG + 30 MG FILMOMHULDE TABLETTEN APREMILAST TEVA 30 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN filmomhulde tabletten

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 9 juli 2024

1.3.1 : Bijsluiter

Bladzijde : 5

Dag 2	10 mg (lichtroze)	10 mg (lichtroze)	20 mg
Dag 3	10 mg (lichtroze)	20 mg (beige)	30 mg
Dag 4	20 mg (beige)	20 mg (beige)	40 mg
Dag 5	20 mg (beige)	30 mg (roze)	50 mg
Dag 6 en daarna	30 mg (roze)	30 mg (roze)	60 mg

### Mensen met ernstige nierproblemen

Als u ernstige nierproblemen heeft, is de geadviseerde dosis van dit medicijn 30 mg **eenmaal daags (ochtenddosis)**. Wanneer u voor het eerst start met de inname van dit medicijn zal uw arts met u bespreken hoe uw dosis moet worden verhoogd.

### Hoe en wanneer neemt u dit medicijn in?

- Dit medicijn is bestemd voor inname via de mond (oraal gebruik).
- Slik de tabletten in hun geheel door, bij voorkeur met water.
- U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen.
- Neem dit medicijn elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in, één tablet in de ochtend en één tablet in de avond.
- Om de tabletten uit de blisterverpakking te halen, buig de blisterverpakking en scheur deze langs de perforatie zodat er een enkel deel vrijkomt. Begin bij de pijl en trek vervolgens voorzichtig het gelabelde papierfolie van het enkele deel. Duw de tablet niet door het papierfolie.

Raadpleeg uw arts als uw aandoening na zes maanden behandeling niet verbeterd is.

### Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?

Als u te veel van dit medicijn heeft ingenomen, neem dan contact op met een arts of ga onmiddellijk naar een ziekenhuis. Neem de verpakking van het medicijn en deze bijsluiter met u mee.

### Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?

- Als u een dosis van dit medicijn bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over. Neem de volgende dosis op het normale tijdstip in.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### Als u stopt met het innemen van dit medicijn

- U moet dit medicijn blijven innemen totdat uw arts u zegt dat u ermee kunt stoppen.
- Stop niet met de inname van dit medicijn zonder dit eerst met uw arts te bespreken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

**Gerenvooidere versie**

**APREMILAST TEVA 10 MG + 20 MG + 30 MG FILMOMHULDE TABLETTEN  
APREMILAST TEVA 30 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN  
filmomhulde tabletten**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 9 juli 2024**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Bladzijde : 6**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

**Ernstige bijwerkingen - depressie en zelfmoordgedachten**

Neem onmiddellijk contact op met uw arts over alle veranderingen in gedrag of stemming, depressieve gevoelens, gedachten van zelfmoord of zelfmoordgedrag (deze komen soms voor).

**Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen** (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- Diarree.
- Misselijkheid.
- Hoofdpijn.
- Bovensteluchtweginfecties zoals verkoudheid, loopneus, sinusinfectie.

**Bijwerkingen die vaak voorkomen** (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Hoesten.
- Rugpijn.
- Braken.
- Gevoel van vermoeidheid.
- Maagpijn.
- Verlies van eetlust.
- Frequente stoelgang.
- Slaapproblemen (slapeloosheid).
- Spijsverteringsstoornissen of brandend maagzuur.
- Ontsteking en zwelling van de hoofd luchtwegen naar uw longen (bronchitis).
- Verkoudheid (nasofaryngitis).
- Depressie.
- Migraine.
- Spanningshoofdpijn.

**Bijwerkingen die soms voorkomen** (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Huiduitslag.
- Netelroos (urticaria).
- Gewichtsverlies.
- Allergische reactie.
- Bloeding in de darm of in de maag.
- Zelfmoordgedachten of -gedrag.

**Bijwerkingen waarvan onbekend is hoe vaak ze voorkomen** (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

- Ernstige allergische reactie (kan onder andere bestaan uit zwelling van het gezicht, de lippen, de mond, de tong of de keel waardoor moeite met ademen of slikken kan ontstaan).

## Gerenvoieerde versie

### APREMILAST TEVA 10 MG + 20 MG + 30 MG FILMOMHULDE TABLETTEN APREMILAST TEVA 30 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN filmomhulde tabletten

#### MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 9 juli 2024

Bladzijde : 7

Als u 65 jaar of ouder bent, kunt u een groter risico lopen op de complicaties ernstige diarree, misselijkheid en braken. Als uw darmproblemen ernstig worden, moet u met uw arts overleggen.

#### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## 5. HOE BEWAART U DIT MEDICIJN?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de blisterverpakking en de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit medicijn niet als u ziet dat de verpakking beschadigd is of tekenen van knoeien vertoont.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

### Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is apremilast.

- Apremilast Teva 10 mg filmomhulde tabletten: elke filmomhulde tablet bevat 10 mg apremilast.
- Apremilast Teva 20 mg filmomhulde tabletten: elke filmomhulde tablet bevat 20 mg apremilast.
- Apremilast Teva 30 mg filmomhulde tabletten: elke filmomhulde tablet bevat 30 mg apremilast.

De andere stoffen (hulpstoffen) in de tabletkern zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, croscarmellosenatrium en magnesiumstearaat.

De filmomhulling bevat: hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol, rood ijzeroxide (E172). Apremilast Teva 20 mg filmomhulde tabletten bevatten ook geel ijzeroxide (E172).

### Hoe ziet Apremilast Teva eruit en wat zit er in een verpakking?

**Gerenvooidere versie**

**APREMILAST TEVA 10 MG + 20 MG + 30 MG FILMOMHULDE TABLETTE  
APREMILAST TEVA 30 MG, FILMOMHULDE TABLETTE  
filmomhulde tabletten**

**MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Datum : 9 juli 2024**

**Bladzijde : 8**

Apremilast Teva 10 mg filmomhulde tabletten zijn lichtroze, ovale, filmomhulde tabletten, met de inscriptie "TV" op de ene zijde en "Y2" op de andere zijde. De tabletafmetingen zijn ongeveer 9 mm x 5 mm.

Apremilast Teva 20 mg filmomhulde tabletten zijn beige, ovale, filmomhulde tabletten, met de inscriptie "TV" op de ene zijde en "Y3" op de andere zijde. De tabletafmetingen zijn ongeveer 11 mm x 6 mm.

Apremilast Teva 30 mg filmomhulde tabletten zijn roze, ovale, filmomhulde tabletten, met de inscriptie "TV" op de ene zijde en "Y4" op de andere zijde. De tabletafmetingen zijn ongeveer 12 mm x 7 mm.

Apremilast Teva 10 mg + 20 mg + 30 mg filmomhulde tabletten (startverpakking met ochtend- en avond aanduiding: zon/maan symbolen)

De startverpakking bestaat uit 27 filmomhulde tabletten (4 x 10 mg tabletten, 4 x 20 mg tabletten, 19 x 30 mg tabletten) in geperforeerde PVC - Aluminium/Papierfolie blisterverpakkingen.

Verpakkingsgrootten: 27 tabletten (in een standaard blisterverpakking).

27x1 tabletten (in een eenheidsblisterverpakking).

Apremilast Teva 30 mg, filmomhulde tabletten

PVC - Aluminium geperforeerde blisterverpakking.

Verpakkingsgrootten: 30x1 (in een eenheidsblisterverpakking), 56, 56x1 (in een eenheidsblisterverpakking), 60, 168x1 (in een eenheidsblisterverpakking).

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen*

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

*Fabrikant*

Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

Ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Polen

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25

10000, Zagreb

Kroatië

**In het register ingeschreven onder**



**Gerenvooidere versie**

**APREMILAST TEVA 10 MG + 20 MG + 30 MG FILMOMHULDE TABLETTEN  
APREMILAST TEVA 30 MG, FILMOMHULDE TABLETTEN  
filmomhulde tabletten**

**MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS**

**1.3.1 : Bijsluiter**

**Datum : 9 juli 2024**

**Bladzijde : 9**

RVG 131131, filmomhulde tablet 10 mg + 20 mg + 30 mg

RVG 131132, filmomhulde tablet 30 mg

**Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:**

Zweden	Apremilast Teva
Oostenrijk	Apremilast-ratiopharm 10 mg + 20 mg + 30 mg Filmtabletten Apremilast-ratiopharm 30 mg Filmtabletten
België	Apremilast Teva 10 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten Apremilast Teva 20 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten Apremilast Teva 30 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten
Tsjechië	Apremilast Teva
Duitsland	Apremilast-ratiopharm 10 mg + 20 mg + 30 mg Filmtabletten Apremilast-ratiopharm 30 mg Filmtabletten
Denemarken	Apremilast Teva
Griekenland	Apremilast/Teva
Spanje	Apremilast Teva 10 mg + 20 mg + 30 mg comprimidos recubiertos con película EFG Apremilast Teva 30 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Finland	Apremilast ratiopharm 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Frankrijk	APREMILAST TEVA 10 mg, comprimé pelliculé APREMILAST TEVA 20 mg, comprimé pelliculé APREMILAST TEVA 30 mg, comprimé pelliculé
Italië	Apremilast Teva
Nederland	Apremilast Teva 10 mg + 20 mg + 30 mg filmomhulde tabletten Apremilast Teva 30 mg, filmomhulde tabletten
Polen	Apremilast Teva
Slowakije	Apremilast Teva 10 mg Apremilast Teva 20 mg Apremilast Teva 30 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2024

0724.2v.LD